

化学殺虫剤
 オルトラン粒剤
 (アセフェート粒剤)

農林水産省登録番号：第19993号
 最終変更登録日：2014年11月17日

[適用病害虫と使用方法]

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセフェートを含む農薬の総使用回数			
キャベツ	アオムシ、コナガヨトウムシ アブラムシ類	3~6kg/10a (1~2g/株)	定植時	1回	植穴処理	2回以内 (定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は1回以内)			
	アブラムシ類	6g/m ²	育苗期		散布				
トマト	アブラムシ類 オシツコナジラミ	3~6kg/10a (1~2g/株)	定植時		1回	作条散布 又は植穴処理	1回		
きゅうり なす	アブラムシ類 アザミウマ類 オシツコナジラミ								
ピーマン	アブラムシ類	2g/株				株元散布			
はくさい	アオムシ、コナガヨトウムシ アブラムシ類	3~6kg/10a (1~2g/株)				植穴処理			
ブロッコリー	ヨトウムシ	6kg/10a (2g/株)	株元散布						
だいこん	アオムシ、コナガアブラムシ類	3~4kg/10a	は種前			作条散布			
かぶ	アブラムシ類	4kg/10a	収穫21日前まで			2回以内		株元散布	2回以内 (株元散布は1回以内、散布は1回以内)
ごぼう		3~6kg/10a	収穫75日前まで						
れんこん		4kg/10a	収穫14日前まで	散布 無人ヘリコプターによる散布					
ばれいしょ	アブラムシ類	3~6kg/10a (1~2g/株)	植付時	1回		作条散布		3回以内 (植付時の処理は1回以内、植付後は2回以内)	
えだまめ	ハモンヨトウ	3~6kg/10a	収穫21日前まで	3回以内	生育期株元散布	3回以内			
なばな	アブラムシ類	6kg/10a	定植時	1回	植溝土壌混和	1回			
			は種時		播溝土壌混和				
花き類・観葉植物	アザミウマ類 アブラムシ類	3~6kg/10a	発生初期	5回以内	株元散布	5回以内			
宿根スターチス	ヨトウムシ類	6kg/10a							
カーネーション	コナガ								
アリウム	ネギコナガ								
きく	ネギリムシ類 ハモグリハエ類								



作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アフェートを含む農薬の総使用回数
たदैい	アラムシ類	セル成型育苗トレイ 1箱またはペーパーポット 1冊 (30x60cm、使用土壌約 1.5~4L) 当り 50g	定植時	1 回	本剤の所定量をセル成型育苗トレイまたはペーパーポットの上から均一に散布する。	1 回
		6kg/10a			株元散布	
いぐさ	イグサシムシガ	4kg/10a	生育期	2 回以内	湛水散布	2 回以内
芝	スジキリヨウシハツガ	10kg/10a	発生初期	5 回以内	全面散布	5 回以内
	タマヤガ	5~10kg/10a				
たばこ	ヨトウムシ、ネキリムシ アラムシ類 アサミウマ類 ジャガイモガ ヤサイゾウムシ	3~6kg/10a	移植前	1 回	作条散布後 土壌混和	2 回以内
			本畑初期		株元散布	