

収穫前日まで  
おっ、使える!!

信頼の総合殺菌剤!!

**オーリサイド**<sup>®</sup>  
水和剤80

りんごの病害防除に!!



黒星病



黒点病



斑点落葉病



輪紋病



褐斑病



すす点病



すす斑病



炭疽病

総合殺菌剤

# アリスライフサイエンス 水和剤80

## 果樹・小麦・野菜に

### ■適用病害と使用方法(抜粋)

2025年6月現在の登録内容

| 作物名    | 適用病害虫名                                 | 希釈倍数<br>(倍) | 使用液量<br>(10a当り) | 使用時期       | 本 剤 の<br>使用回数 | 使用<br>方法 | キャブタンを含む<br>農薬の総使用回数                        |      |
|--------|----------------------------------------|-------------|-----------------|------------|---------------|----------|---------------------------------------------|------|
| りんご    | 黒星病                                    | 600～1000    | 200～700ℓ        | 収穫前日<br>まで | 6回以内          | 散<br>布   | 6回以内                                        |      |
|        | 黒点病                                    | 800～1200    |                 |            |               |          |                                             |      |
|        | 斑点落葉病<br>輪紋病、褐斑病<br>すす点病<br>すす斑病       | 600～800     |                 |            |               |          |                                             |      |
|        | 炭疽病                                    | 800         |                 |            |               |          |                                             |      |
| な し    | 赤星病、黒星病<br>輪紋病                         | 600～1000    |                 | 収穫3日前まで    | 9回以内          |          | 9回以内                                        |      |
|        | 疫病                                     | 1000        |                 |            |               |          |                                             |      |
|        | 炭疽病                                    | 800         |                 |            |               |          |                                             |      |
| ぶどう    | 晩腐病、褐斑病<br>灰色かび病<br>べと病<br>枝膨病<br>黒とう病 |             |                 | 収穫30日前まで   | 3回以内          |          | 3回以内                                        |      |
| おうとう   | 褐色せん孔病<br>灰星病、炭疽病                      |             |                 | 収穫3日前まで    | 5回以内          |          | 5回以内                                        |      |
| マルメロ   | 黒点病                                    |             |                 | 1000       | 収穫14日前まで      |          | 6回以内                                        | 6回以内 |
| 小粒核果類※ | 黒星病                                    | 800～1000    |                 | 収穫21日前まで   | 3回以内          |          | 5回以内<br>(生育期は2回以内、<br>収穫終了後～<br>落葉期までは3回以内) |      |
|        | すす斑病                                   | 800         |                 |            |               |          |                                             |      |
| ブルーベリー | 斑点病                                    | 500～1000    |                 |            | 2回以内          |          |                                             |      |
|        | すす点病<br>灰色かび病                          | 500         |                 |            |               |          |                                             |      |
| パイナップル | 根腐萎凋病                                  |             |                 | 300～400ℓ   | 3回以内          |          | 3回以内                                        |      |
| も も    | 縮葉病                                    | 600         |                 | 200～700ℓ   | 発芽前           |          | 4回以内                                        | 4回以内 |
| パパイヤ   | 炭疽病<br>黒腐病                             |             |                 |            | 収穫14日前まで      |          | 3回以内                                        | 3回以内 |
| マンゴー   | 炭疽病                                    |             |                 |            |               |          |                                             |      |
| か き    | 落葉病<br>炭疽病<br>すす点病                     | 1000        | 収穫7日前まで         | 5回以内       | 5回以内          |          |                                             |      |
| くるみ    | 炭疽病、褐斑病                                | 800         |                 | 4回以内       | 4回以内          |          |                                             |      |

※「小粒核果類」には、うめ、すもも、あんず等が含まれます。

上記の作物以外にも、小麦、はくさい、トマト、きゅうり、すいか、メロン、かぼちゃ、ごぼう、たまねぎ、しょうが、いちご、いんげんまめ、花き類・観葉植物、芝等に適用があります。

#### ■使用上の注意(抜粋)

- りんごの斑点落葉病に対して、初期の防除を主体としてください。また、黒点病、黒星病などとの同時防除に使用するのが有効です。
- ぶどうに使用する場合、幼果期～袋掛けまでの散布は、果粉の溶脱や果実の汚染を生じることがあるので十分注意してください。
- おうとうに使用する場合、5月下旬以降の散布には、固着性の強い展着剤を加用しないください。
- うめの5月下旬以降の防除は高温時をさけて散布してください。
- ももの縮葉病防除に使用する場合、必ず発芽前に散布してください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。●空袋はほ場等に放置せず適切に処理してください。

アリスライフサイエンス株式会社

〒103-0027 東京都中央区日本橋一丁目4番1号  
TEL 03-5203-9350 FAX 03-5203-9349  
<https://www.arystalifescience.jp/>



最新の登録内容