





信頼と実績の総合殺菌剤

野菜 小麦 果樹

大切な果樹・小麦・野菜に！

オーソサイド®

水和剤80



提供：やまがたアグリネット (<http://agrin.jp/>)

提供：和歌山県うめ研究所

■適用病害と使用方法

2025年6月現在の登録内容

作物名	適用病害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	キャプタンを含む農薬の総使用回数			
小麦	赤かび病、葉枯症、心枯病	600～1000	60～150ℓ/10a	収穫14日前まで	4回以内	散 布	4回以内			
	黒変病、黒点病	1000～1500								
りんご	黒星病	600～1000	200～700ℓ/10a	収穫前日まで	6回以内		6回以内			
	黒点病	800～1200								
	斑点落葉病、輪紋病、褐斑病、すす点病、すす斑病	600～800								
	炭疽病	800								
なし	赤星病、黒星病、輪紋病	600～1000		200～700ℓ/10a	収穫3日前まで		9回以内	9回以内		
	疫病	1000								
ぶどう	炭疽病	800		200～700ℓ/10a	収穫30日前まで		3回以内	3回以内		
	晩腐病、褐斑病、灰色かび病、べと病、枝彫病、黒とう病	800								
おうとう	褐色せん孔病、灰星病、炭疽病			200～700ℓ/10a	収穫3日前まで		5回以内	5回以内		
マルメロ	黒点病	1000						200～700ℓ/10a	収穫14日前まで	6回以内
小粒核果類	黒星病	800～1000		200～700ℓ/10a	収穫21日前まで		3回以内			
	すす斑病	800								
ブルーベリー	斑点病	500～1000	200～700ℓ/10a	収穫21日前まで	2回以内		5回以内			
	すす点病、灰色かび病	500					(生育期は2回以内、収穫終了後～落葉期までは3回以内)			
もも	縮葉病	600	200～700ℓ/10a	発芽前	4回以内		4回以内			
パイナップル	根腐萎凋病	500					200～700ℓ/10a	収穫21日前まで	3回以内	3回以内
パパイア	炭疽病、黒腐病	600	200～700ℓ/10a	収穫14日前まで	3回以内					3回以内
マンゴー	炭疽病	600					200～700ℓ/10a	収穫7日前まで	5回以内	5回以内
かき	落葉病、炭疽病、すす点病	1000	200～700ℓ/10a	収穫7日前まで	4回以内					4回以内
くるみ	炭疽病、褐斑病	800					200～700ℓ/10a	収穫7日前まで	4回以内	6回以内
はくさい	黒斑病、白斑病、苗立枯病	600～1200	200～700ℓ/10a	収穫前日まで	5回以内					(種子粉衣は1回以内、は種後は5回以内)
	べと病、炭疽病	600								
トマト	疫病	800～1200	200～700ℓ/10a	収穫前日まで	5回以内		5回以内			
	葉かび病、灰色かび病	800								
きゅうり	炭疽病、褐斑病、つる枯病	600～800	200～700ℓ/10a	収穫前日まで	5回以内		5回以内			
	べと病	600					(種子粉衣は1回以内、は種後は5回以内)			
すいか	べと病、つる枯病	400～800	200～700ℓ/10a	収穫14日前まで	5回以内		6回以内			
	炭疽病	400～800					(種子粉衣は1回以内、は種後は5回以内)			
メロン	べと病	600	200～700ℓ/10a	収穫14日前まで	5回以内		5回以内			
しろうり	炭疽病	400～800					200～700ℓ/10a	収穫14日前まで	5回以内	5回以内
かぼちゃ	炭疽病	400～800	200～700ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内					5回以内
ごぼう	黒斑病	800					200～700ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内	(塊茎粉衣は1回以内、灌注は2回以内、散布は2回以内)
たまねぎ	灰色かび病、白色疫病、苗立枯病、軟腐病	600	200～700ℓ/10a	収穫7日前まで	2回以内					3回以内
葉たまねぎ	灰色かび病、白色疫病、苗立枯病	600					200～700ℓ/10a	収穫3日前まで	2回以内	(種子粉衣は1回以内、は種後は2回以内)
しょうが	白星病	800	200～700ℓ/10a	収穫開始14日前まで	5回以内					5回以内
いちご	灰色かび病、炭疽病、芽枯病	800					200～700ℓ/10a	収穫30日前まで	2回以内	3回以内
いんげんまめ	炭疽病	600～1200	200～700ℓ/10a	収穫30日前まで	2回以内					(種子粉衣は1回以内、は種後は2回以内)
花き類・観葉植物 (ばら、りんどう、せんにちこう、コスモス、 ひまわり、シネラリア、スイートピー、みやこすれ、 アンズリウム、斑入りアマドコロを除く)	茎腐病、立枯病、苗立枯病	600					200～700ℓ/10a	－	8回以内	8回以内
	黒星病	800								
	茎腐病、立枯病、苗立枯病	600								
	葉枯病、茎腐病、立枯病、苗立枯病									
	斑葉病、茎腐病、立枯病、苗立枯病									
	そうか病、茎腐病、立枯病、苗立枯病									
	べと病、黒斑病、茎腐病、立枯病、苗立枯病									
	褐斑病、茎腐病、立枯病、苗立枯病									
	腰折病、茎腐病、立枯病、苗立枯病									
	根腐病、茎腐病、立枯病、苗立枯病									
	斑点病、茎腐病、立枯病、苗立枯病									
	炭疽病									
	炭疽病		1000							
	葉腐病(ブラウンパッチ)		300～500	0.5～2ℓ/m ²	発病初期					
	赤焼病		500～800							
	炭疽病		300～800							
西洋芝(ベントグラス)	炭疽病	300～500	0.5ℓ/m ²							

■適用雑草と使用方法

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	キャプタンを含む農薬の総使用回数
			薬量	希釈水量			
西洋芝(ベントグラス)	藻類、コケ類	芝生育期(雑草発生初期)	1~2g/m ²	0.5ℓ/m ²	8回以内	散布	8回以内