



UPL

アリスタ ライフサイエンスは
UPLグループの一員です

選ばれて、使われて。長年の実績が信頼の証。

トクチオン[®] 乳剤

殺虫剤分類 1B

[®] はアリスタ ライフサイエンス(株)の登録商標です。

アザミウマ類、ネダニ類、
ハダニ類などの難防除害虫に



適用拡大でさらに使いやすく!

●ねぎ/クロバネキノコバエ類

●いちご/アブラムシ類

●キャベツ/シロイチモジヨトウ

●てんさい/ハダニ類 (1500倍が追加)

★たまねぎ、ねぎ、にんにく、てんさいで
無人航空機散布ができるようになりました!

トクチオン乳剤の特長

- 野菜、果樹、茶、花き類などに発生する多くのチョウ目害虫(ハマキムシ類、コナガ、ヨトウムシなど)、アブラムシ類、コナカイガラムシ類、アザミウマ類、ハダニ類に優れた殺虫力を持つ、まさに農家の常備薬です。
- 接触毒と食毒の作用を持ち、効果の発現はやや遅効的ですが、優れた殺虫力を発揮し、比較的残効性のある薬剤です。



ネダニ



ネギアザミウマ



ミカンキイロアザミウマ



ツメクサガ



ハリガネムシ類



ハダニ

アリスタ ライフサイエンス株式会社

適用害虫および使用方法

(2025 年6 月現在の登録)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	プロチオホスを含む 農薬の総使用回数				
み か ん	コカクモンハマキ、フラーパラゾウムシ	1000倍	200～700ℓ /10a	収穫30日前まで	3回以内	散 布	3回以内				
な し	フジコナカイガラムシ	1000～1500倍		収穫60日前まで	5回以内		5回以内				
か き	カキノヘタムシガ フジコナカイガラムシ、マイマイガ アザミウマ類、ハマキムシ類	1000倍		収穫75日前まで	2回以内		2回以内				
く り	モモノゴマダラノメイガ ネズジキノカワガ			（但し収穫7日前まで）	5回以内		5回以内				
キャベツ	コナガ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ アオムシ、ウツバ類、アブラムシ類 シロイチモジヨトウ	100～300ℓ /10a	収穫21日前まで	2回以内	無人航空機 による散布	2回以内					
たまねぎ	アザミウマ類		収穫7日前まで	4回以内		4回以内					
	シロイチモジヨトウ										
	ネギハモグリバエ										
にんにく	アザミウマ類	16倍	1.6ℓ/10a	3回以内	散 布	4回以内 種球浸漬は 1回以内、 散布及び 無人航空機散布は 合計3回以内					
	ネギコガ チューリップサビダニ アザミウマ類	1000倍	100～300ℓ/10a								
	チューリップサビダニ	16倍	1.6ℓ/10a								
ばれいしょ	ジャガイモガ、ヨトウムシ アブラムシ類	1000倍	—	収穫14日前まで	3回以内	120分間 種球浸漬	3回以内				
	ナカジロシタバ							1000～2000倍	収穫21日前まで		
かんしょ	ハスモンヨトウ	1000倍	100～300ℓ /10a	収穫30日前まで	2回以内	散 布	4回以内 （植付前の土壌混和は 1回以内、散布は3回以内）				
あすき	アズキノメイガ、ツメクサガ	1000倍		収穫21日前まで	3回以内		2回以内				
いんげんまめ	ハダニ類	1000～1500倍		収穫30日前まで	2回以内		2回以内				
だいず	マメシンクイガ、ハダニ類	1000倍		収穫21日前まで	3回以内		3回以内				
	シロイチモジマダラメイガ ハスモンヨトウ、アブラムシ類 ツメクサガ、カメムシ類	1000倍		収穫30日前まで	2回以内		2回以内				
てんさい	ヨトウムシ、カメノコハムシ アブラムシ類、ハダニ類	1000～1500倍		1.6ℓ/10a	無人航空機 による散布		2回以内				
	デンサイモグリハナバエ デンサイトビハムシ	1000倍									
	ヨトウムシ、カメノコハムシ、アブラムシ類 ハダニ類、デンサイモグリハナバエ デンサイトビハムシ	16倍									
茶	ハマキムシ類、チャノキイロアザミウマ カンザワハダニ、チャドクガ	1000倍	200～400ℓ/10a	摘採21日前まで	1回	散 布	1回				
さとうきび	アオドウガネ ハリガネムシ類		1.8ℓ/㎡	収穫90日前まで	2回以内	土壌灌注	2回以内 （植付時の土壌混和 は1回以内）				
ねぎ	アザミウマ類、シロイチモジヨトウ ネギコガ、ネギハモグリバエ		100～300ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内	散 布	4回以内 （定植時の土壌混和は 1回以内、散布、 無人航空機散布及び 株元灌注は合計3回以内）				
	ネダニ類、クロバネキノコバエ類	16倍	1.6ℓ/10a	無人航空機 による散布	3回以内						
にら	ネダニ類	2000倍	3ℓ/㎡	収穫21日前まで	1回	株元灌注	2回以内 （土壌混和は1回以内、 株元灌注は1回以内）				
らっきょう	ネダニ類			収穫60日前まで			1回				
いちご	ハダニ類 キンケクチプトゾウムシ成虫 アブラムシ類	1000倍	100～300ℓ /10a	収穫75日前まで	3回以内	散 布	3回以内 （仮植床植付時の 土壌混和は1回以内）				
花き類・観葉植物 （ばら、さく、 プリムラ、シクラメン ペゴニア、 宿根かすみそを除く）	アザミウマ類 ハダニ類			発生初期	5回以内						
	アブラムシ類、フラーパラゾウムシ アザミウマ類、ハダニ類										
ばら	キンケクチプトゾウムシ成虫 アザミウマ類、ハダニ類							6回以内			
プリムラ シクラメン ペゴニア											
宿根かすみそ	ヨトウムシ、ナスハモグリバエ アザミウマ類、ハダニ類				5回以内						
樹木類 （つばき類、さくら、 プラタナスを除く）	フラーパラゾウムシ							3回以内			
つばき類	チャドクガ、フラーパラゾウムシ				4回以内						
さくら プラタナス	アメリカシロヒトリ フラーパラゾウムシ										
たばこ	タバコアオムシ、ヨトウムシ アブラムシ類、ジャガイモガ アザミウマ類				25～180ℓ /10a		収穫10日前まで				2回以内
芝	シバツトガ				0.5～1ℓ/㎡		発生初期	3回以内	5回以内		

■ 使用上の注意(抜粋)

- にらに使用する場合は、前作のにらを地際から刈り取りした後、できるだけ速やかに株元灌注し、希釈液が直接茎葉にかからないように注意してください。 ●たまねぎに対して希釈倍数300倍で散布する場合は、少量散布に適合したノズルを装着した乗用型・速度連動式地上液剤散布装置を使用してください。 ●蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。 ●ミツバチの巣箱及びその周辺にからないように使用してください。無人航空機による散布でそれらに飛散するおそれがある場合には使用しないでください。
- 眼に入らないよう注意してください。 ●皮膚に付着しないよう注意して使用してください。 ●火気には十分に注意してください。
- 解毒剤…動物実験で硫酸アトロピン製剤が有効だと報告されています。
- 魚毒性等…水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。無人航空機による散布で使用する場合は、飛散しないよう特に注意してください。使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器等は水産動植物に影響を与えないように適切に処理してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。●空容器はほ場等に放置せず適切に処理してください。

●冬期に保管すると容器の底部に沈降物が認められる場合があります。そのような場合には、使用前に容器を逆さまにしてボトルを十数秒程度振っていただく均一に分散し、効果・物理性共に問題なくご使用いただけます。



最新の登録内容

アリスタライフサイエンス株式会社
〒103-0027 東京都中央区日本橋一丁目4番1号
TEL.03-5203-9350
<https://www.arystalifescience.jp/>