

イネ科雑草専用茎葉処理除草剤

 セレクト® 乳剤

®はアリスタ ライフサイエンス株式会社の登録商標

スズメノカタビラ防除、選ぶならセレクト。

スズメノカタビラ



イヌビエ



メヒシバ



特長

スズメノカタビラに高い効果

今までのイネ科雑草防除用茎葉処理剤では防除が困難であったスズメノカタビラに対して、高い除草効果を示します。

一年生、多年生を問わず広範なイネ科雑草に高い効果

イヌエビ・メヒシバなどの1年生イネ科雑草からシバムギ、レッドトップなどの多年生イネ科雑草に高い除草効果を示します。

広葉作物に高い安全性

イネ科植物と非イネ科植物との間にきわめて高い選択性があるので、マメ類、テンサイ、タマネギなどの広葉作物や非イネ科作物に安心して使用できます。

適用作物・雑草と使用方法


(2015年12月現在の登録)

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	クレトジムを含む農薬の総使用回数
			薬量	希釈水量				
あすき	一年生イネ科雑草 (スズメノカタビラを除く)	雑草生育期 (イネ科雑草3~5葉期) 収穫45日前まで	35~50mL/10a	50~75mL/10a	1回	雑草茎葉散布	全 域	1回
	スズメノカタビラ		50~75mL/10a					
いんげんまめ	一年生イネ科雑草 (スズメノカタビラを除く)	雑草生育期 (イネ科雑草3~5葉期) 収穫60日前まで	35~50mL/10a	50~75mL/10a	1回	雑草茎葉散布	全 域	1回
	スズメノカタビラ		50~75mL/10a					
だいす	一年生イネ科雑草 (スズメノカタビラを除く)	雑草生育期 (イネ科雑草3~5葉期) 収穫50日前まで	35~50mL/10a	50~75mL/10a	1回	雑草茎葉散布	全 域	1回
	スズメノカタビラ		50~75mL/10a					
	スズメノカタビラ		50~75mL/10a					
えだまめ	一年生イネ科雑草 (スズメノカタビラを除く)	雑草生育期 (イネ科雑草3~5葉期) 収穫14日前まで	35~50mL/10a	50~75mL/10a	2回以内	雑草茎葉散布	全 域	2回以内
	スズメノカタビラ		50~75mL/10a					
	スズメノカタビラ		50~75mL/10a					
てんさい	一年生イネ科雑草 (スズメノカタビラを除く)	雑草生育期 (イネ科雑草3~5葉期) 収穫30日前まで	35~50mL/10a	100mL/10a	2回以内	雑草茎葉散布	全 域	2回以内
	シバムギ、レッドトップ スズメノカタビラ		50~75mL/10a					
かんしょ	一年生イネ科雑草	雑草生育期 (イネ科雑草3~5葉期) 収穫100日前まで	35~50mL/10a	50~75mL/10a	1回	雑草茎葉散布	全 域	1回
ばれいしょ		雑草生育期 (イネ科雑草3~5葉期) 収穫30日前まで	50~75mL/10a		1回			1回
いわんこ		雑草生育期 (イネ科雑草3~5葉期) 収穫30日前まで	50~75mL/10a		3回以内			3回以内
にんじん		雑草生育期 (イネ科雑草3~5葉期) 収穫40日前まで	50~75mL/10a		1回			1回
にんにく		雑草生育期 (イネ科雑草3~5葉期) 収穫30日前まで	50~75mL/10a		2回以内			2回以内
アスパラガス		雑草生育期 (イネ科雑草3~5葉期) 収穫前日まで	50~75mL/10a		1回			1回
かのこそう		雑草生育期 (イネ科雑草3~5葉期) 収穫45日前まで	75mL/10a		3回以内	雑草茎葉散布 (落水)		3回以内
いぐさ	水田一年生イネ科雑草	落水後雑草生育期 (イネ科雑草3~5葉期) (入水15日前まで)	75mL/10a					


この時期が散布適期です!!



セレクト乳剤散布



広葉作物は枯れずに、イネ科雑草だけ枯らします!



使用上の注意事項(拔粋)

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 散布液の調製に当たっては、使用の直前に本剤の所定量を所定量の水にうすめ、よくかき混ぜてから使用してください。
- イネ科雑草優占の圃場で使用してください。広葉雑草およびカヤツリグサ科雑草などが混在する場合には、これらの雑草に有効な除草剤との体系で使用してください。
- 展着剤を加用するとより一層効果的です。
- イネ科雑草の生育期に有効であるが、雑草が大きくなりすぎると効果が劣るので、時期を逃さないように均一に散布してください。
- やや遅効性であり、イネ科雑草を完全に枯殺するまでに通常1週間から2週間前後を要するが、スズメノカタビラに対してはさらに期間を要する場合があるので、誤ってまき直しないように注意してください。
- イネ科作物には薬害をおこすおそれがあるので、周囲にイネ科作物がある場合は、薬剤が飛散しないように注意してください。
- 激しい降雨の予想される場合は使用を避けてください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

- 使用前にはラベルをよく読んでください。● ラベルの記載以外には使用しないでください。● 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
- 空容器は圃場などに放置せず、3回以上水洗し、適切に処理してください。洗浄水はタンクに入れてください。● 防除日誌を記帳しましょう。

アリストライフサイエンス株式会社

〒104-6591 東京都中央区明石町8-1

TEL.03-3547-4416 FAX.03-3547-4695

<http://www.arystalifescience.jp>